



التحليل المكاني للمناولات في محافظة النجف باستعمال برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS)

م. رفل حسين نجم	أم. م. منال شنين علي	أ.م. د. ظلال جواد كاظم
جامعة بابل	وزارة التربية	جامعة الكوفة
كلية التربية للعلوم الإنسانية	مديرية التربية النجف	كلية التربية للبنات



Spatial analysis of apiaries in Najaf using the Geographic Information Systems (GIS) program

Lecturer.Rafal Hussein NAJM
Department of Geography
college of education for
humanities university of
babylon

Assistant Lecturer
Manal Shnain Ali
Ministry of Education /
Directorate of Education,
Najaf

Assistant Professor
dr.dhilal Jawad Kadhim
Yassin
College of Science for
Girls University of Kufa



الملخص

يعد التحليل المكاني للمناحل في محافظة النجف مؤشر مهم لمعرفة التوزيع الجغرافي لها وانماطها واتجاهاتها المكانية . فنحل العسل من الكائنات التي لا يمكن فصلها عن البيئة المحيطة بها لأنه يعتمد بالدرجة الأساس على ما تجود به لمتطلبات حياتها فهي تحدد طبيعة الغطاء النباتي باشكاله المختلفة من مراعي وإنتاج زراعي وما يتبع ذلك من عوامل طبيعية وبشرية تؤثر في إمكانات إنشاء المناحل وتوزيعها وكثافتها تبعاً للظروف المناسبة لها لتوفير حاجته الغذائية التي تضمن للنحل البقاء وللنحال الإنتاج بمواسم مختلفة .

محافظة النجف من المحافظات العراقية التي عرفت بتربية النحل وهي محافظة تتبع فيها مظاهر سطح الأرض باختلاف تلك المظاهر وما تحويه من عناصر ثانوية قد تشكل عوامل جذب لتركيز تربية النحل في مكان دون سواه لذا كان الهدف من هذه الدراسة بيان التوزيع الجغرافي لتلك المناحل والتحليل المكاني لذلك التوزيع لمعرفة الأتماط السائدة له وفق معادلة الجار الأقرب والاتجاه العام لتلك المناحل مما يعطي صورة واضحة تكون أساساً لدراسات متخصصة حول التأثير والتاثير بهذا التوزيع سواء من الجانب الجغرافي او الزراعي .

تم استحصل البيانات الخاصة بالمناحل من مديرية زراعة النجف / قسم الوقاية وجمعية نحالي النجف التخصصية فضلاً عن مركز أبحاث نحل العسل العراقي . أما تحديد المواقع فتم استحصل احداثيات مواقع المناحل من الجهات المذكورة ثم تحويلها إلى نقاط على الخريطة من خلال برنامج Arc Map 10.2.2 .

وبتوزيع النشاط وعرضه مع مظاهر سطح الأرض ذات العلاقة وتم قياس الارتباط بالطرق النظرية واعتماداً على اتجاه التوزيع فوجد ان المياه السطحية تمثل أهم عوامل الجذب المكاني لنشاط تربية النحل في منطقة الدراسة فضلاً عن أهمية المظاهر الأخرى التي تعد تكميلية في استدامة النشاط المذكور

Abstract

The spatial analysis of apiaries in Najaf Governorate is an important indicator for. knowing their geographical distribution, spatial patterns and trends .

Bees honey is one of the organisms that cannot be separated from the surrounding environment because it depends mainly on what it exists for the requirements of its life. It determines the nature of the vegetation in its various forms of pastures and agricultural production and the following natural and human factors that affect the possibilities of creating and distributing bees and their density according to the appropriate conditions. It has to provide for its nutritional need that guarantees the bees to stay and to beekeepers production in different seasons. Najaf Governorate is one of the Iraqi governorates known as beekeeping. It is a governorate in which the appearances of the surface of the earth vary according to those aspects and what they contain of secondary elements that may constitute attractions for the concentration of beekeeping in a place other than anyone. So the aim of this study was to show the geographical distribution of these bees and the spatial analysis of that distribution To know the prevailing patterns of it according to the equation of the closest neighbor and the general direction of these apiaries, which gives a clear picture that is the basis for specialized studies on the effect and influence of this distribution, whether from the geographical or agricultural side .The data for the apiaries were obtained from the Najaf Agriculture Directorate / Prevention Department and Nahali Najaf Specialized Society as well as the Iraqi Honey Bee Research Center .

As for the positioning, the coordinates of the apiary sites were obtained from the aforementioned authorities, and then converted into points on the map through the Arc Map GIS 10.2.2 program. By distributing the activity and displaying it with the relevant aspects of the Earth's surface, the correlation was measured by theoretical methods and depending on the direction of distribution, it was found that surface water represents the most important spatial attraction factors for beekeeping activity in the study area, despite the importance of other aspects that are integral to the sustainability of the mentioned activity .

الاطار النظري:

مشكلة الدراسة : ما هو واقع التوزيع المكاني للمناحل في محافظة النجف وما هي أهم أنماط ذلك

التوزيع فضلاً عن الاتجاه العام لذلك التوزيع ؟

الفرضية : تحدد مظاهر سطح الأرض توزيع نحل العسل في محافظة النجف على شكل تجمعات خطية باتجاه الأنهار الرئيسية في المحافظة .

الهدف من الدراسة : تهدف الدراسة الى الكشف عن توزيع المناحل في محافظة النجف وانماط واتجاه ذلك التوزيع.

حدود الدراسة : تمثل حدود الدراسة بمحافظة النجف التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من جمهورية العراق خريطة (1) تحدوها من الناحية الادارية محافظتنا بابل وكربيلا من الشمال ومن الشرق محافظة القadesية و المثنى اما من غرب فتحدها محافظة الانبار ، ومن الجنوب

فتحدها المملكة العربية السعودية ، وتقع المحافظة فلكياً بين دائري عرض (29,50 - 32,21 شمالي) وبين خط طول (42,50 - 44,44 شرقياً) وهي بذلك تشغّل حيزاً مساحته (

28824 كم⁽¹⁾) الذي يشكل (6,6 %) من مساحة العراق البالغة (435052 كم⁽¹⁾) ، تتخد المنطقة موقعاً يأخذ امتداداً جغرافياً أشبه بالمستطيل والذي يكون ضلعه القصير حدوداً جنوبية مع المملكة العربية السعودية ، وتضم قسمين رئيسيين من أقسام سطح العراق هما السهل الرسوبي والهضبة الصحراوية اذ يشغل السهل الرسوبي نحو (55 %) من مساحتها أما متبقى المساحة فهو ضمن الهضبة الغربية⁽²⁾.

أما الحدود الزمنية فتمثلت بالبيانات المسجلة لنشاط تربية النحل في منطقة الدراسة لعام (2019) اعتماداً على الدراسة الميدانية والبيانات من المؤسسات ذات العلاقة .

أما الحدود الموضوعية هي التحليل المكاني للمناحل في المحافظة .

الخريطة (١) موقع محافظة النجف من العراق



المصدر : خريطة العراق،جمهورية العراق ، الهيئة العامة للمساحة ، خريطة العراق الإدارية ، مقاييس

.2010، بغداد، 2000000/1

المقدمة :

تعد محافظة النجف من المحافظات التي عرفت تربية نحل العسل الحديثة منذ بداية العقد السابع من القرن الماضي ⁽³⁾. يبين (الجدول 1) ان مجموع المناحل في محافظة النجف بلغ (154) منحلاً لعام (2019)⁽⁴⁾، منها (80) منحلاً حاصل على إجازة رسمية من دائرة وقاية المزروعات وهم يمثلون (52 %) من نحالي المحافظة ⁽⁵⁾.

ويوضح الجدول (1) تصدر مركز قضاء الكوفة بعدد المناحل إذ بلغ (47) منحل تمثل (30.5 %) من إجمالي المناحل في المحافظة، وحلت ناحية العباسية بالمرتبة الثانية بعدد مناحل بلغ (45) منحل مثلاً (29.2 %) من مناحل المحافظة ، تبعها مركز قضاء النجف وناحية الحرية بواقع (12) منحل لكل منهما تمثل (7.8 %) من مجموع نحالي المحافظة لكل منهما ، فيما كانت بقية الوحدات الإدارية في المحافظة اقل من مما سبق ذكره باستثناء ناحية الشبكة التي لم يظهر فيها أي نشاط لتربية النحل الخريطة (2).

ويظهر الجدول نفسه تصدر ناحية العباسية بقية الوحدات في أعداد خلايا النحل في المحافظة إذ ضمت (1620) خلية وهي تمثل (38 %) من مجموع أعداد الخلايا في المحافظة ، تلاها في المرتبة الثانية مركز قضاء الكوفة اذ بلغ عدد خلايا النحل فيه (1300) خلية وتشكل (30.5 %) من إجمالي أعداد خلايا النحل في المحافظة ، وجاءت ناحية الحرية في المرتبة الثالثة بعدد خلايا بلغ (365) خلية تمثل (8.6 %) من إجمالي أعداد خلايا النحل في المحافظة . أما بقية الوحدات الإدارية فقد تراوح أعداد خلايا النحل فيها بين (230) خلية في مركز قضاء النجف تشكل (5.4 %) وأدنى عدد بلغ (80) خلية نحل في مركز قضاء المناذرة.

أما مجموع إنتاج العسل في محافظة النجف فقد بلغ (22480 كغم) عام (2019)⁽⁶⁾ و يبين الجدول (1) تباين توزيعه بين الوحدات الإدارية إذ تصدرت ناحية العباسية المرتبة الأولى بإنتاج بلغ (9072 كغم) وتشكل (40.4 %) من إجمالي إنتاج العسل بالمحافظة ، فيما جاء مركز

قضاء الكوفة بالمرتبة الثانية بإنتاج بلغ (7020 كغم) مثل (31.2 %) من إنتاج العسل بالمحافظة ، أما المرتبة الثالثة فكانت من حصة ناحية الحرية التي بلغ إنتاجها (2007.5 كغم) وهو ما يعادل (8.9 %) من إجمالي إنتاج العسل بالمحافظة. أما بقية الوحدات الإدارية فقد تراوح إنتاج العسل فيها بين (1035 كغم) ويتضمن (7.2 %) من إجمالي كمية العسل المنتج في المحافظة في مركز قضاء النجف وأدنى إنتاج كان في مركز قضاء المناذرة إذ بلغ (400 كغم) من العسل يشكل (1.8 %) من مجموع إنتاج العسل في المحافظة. أما معدل إنتاج الخلية الواحدة من العسل في محافظة النجف فقد بلغ (5.3 كغم/خلية) وسجلت ناحية الحرية أعلى معدلات الإنتاج بلغ (5.5 كغم / خلية)، ولم يكن هناك تباين كبير في الانتاج لبقية الوحدات الإدارية فجميعها متقاربة ما بين (4-5.5 كغم) كما هو موضح بالجدول (1) .

الجدول (1) اعداد خلايا النحل والنحالين وانتاج العسل والمناولات في محافظة النجف

%	المجموع	معدل الإنتاج	انتاج العسل للخالية		أعداد خلايا النحل (خلية)	اعداد المناولات				الوحدة الإدارية
			%	العدد		%	العدد الكلي	غير المجازة	المجازة	
4.6	1035	4.5	5.4	230	7.8	12	6	6	6	م.النجف
4.6	1026	4.5	5.3	228	7.1	11	8	3	3	الحيدرية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	الشبكة
31.2	7020	5.4	30.5	1300	30.5	47	19	28	28	م.الковة
40.4	9072	5.6	38	1620	29.2	45	13	32	32	العباسية
8.9	2007.5	5.5	8.6	365	7.8	12	7	5	5	الحرية
1.8	400	5	1.9	80	3.9	6	4	2	2	م.المناذرة
2.8	640	4	3.8	160	7.1	11	10	1	1	الحيرة
3.6	800	5	3.8	160	4.5	7	5	2	2	المشخاب
2.1	480	4	2.8	120	1.9	3	2	1	1	القادسية
100	22480.5	5.3	100	4263	100	154	74	80	80	المحافظة


المصدر : 1- جمعية نحال النجف التخصصية ، بيانات النحالين ، بيانات غير منشورة (2019) .

2- استماراة الاستبيان .

ثانياً : التوزيع الجغرافي للمناطق في محافظة النجف وفق برنامج (GIS)


يمكن لبرنامج نظم المعلومات الجغرافية ان يكون اسلوب لجمع و تحليل وإدارة البيانات مع مرونة عالية بالعرض ، ومن ضمن أدوات البرامج المذكور يمكن استعمال أدوات التحاليل المكاني (Spatial Analysis)⁽⁷⁾. تم تحديد موقع المناطق في محافظة النجف بعد جمع الاحاديثيات الجغرافية لموقع المناطق وتوحيدتها بصيغة (UTM) وتنظيمها بحسب الوحدات الإدارية واعداد خريطة لمنطقة الدراسة ثم اسقاطها على شكل نقاط (Point data) على الخريطة من خلال برنامج (ArcMap GIS 10.2.2) (الخريطة 3).

الخريطة (2) النسبة الـ



مئوية للمنحل وخلايا النحل وانتاج العسل في محافظة النجف بحسب الوحدات الادارية

المصدر: اعتماداً على الجدول (1)



المصدر : اعتماداً على الدراسة الميدانية

يمكن من بعد ذلك اجراء عدة عمليات من خلال أدوات البرنامج المذكور الخاصة بالتحليل المكاني وأهمها :

1- توزيع المناحل بحسب الارتفاع عن سطح البحر :

تتمثل في شكل سطح الأرض ومستوى انحداره اذ يراعى ان تكون ارض المنحل مستوية لتكون الخلايا داخل المنحل بمستوى واحد ليقلل ذلك احتمالية ميلان أو سقوط الخلايا ويسهل عمليات الفحص الدوري للنحل من قبل النحالين ، كما يسهل استواء الارض اقامة المنشآة التي تتطلبها المناحل النموذجية من ظلة ومخازن للمستلزمات وغرف فرز وتصفية العسل وخزنه ، ويراعى عدم انشاء المناحل في المنخفضات المعرضة لخطر الفيضان والسيول ويفضل اختيار الارضي ذات التصريف الجيد التي تساعده على تصريف مياه الامطار التي قد تحدث اضراراً للخلايا في حال تجمع مياهاها في ارض المنحل . وتحدد مساحة المنحل بعدد الخلايا والمنشآت المقامة وقد حدّدت وزارة الزراعة العراقية مساحة انشاء الظله الخاصة بالمنحل بمساحة لا تقل عن (180 م²) بأبعاد (30*6) م كشرط رئيس من شروط اعطاء القرض الخاص بتأسيس منحل قوامه (60) خلية⁽⁸⁾ .


ومن خلال عمل الخريطة تمثل خطوط ارتفاع السطح في منطقة الدراسة اعتماداً على خريطة الارتفاع الرقمية (Elevation)⁽⁹⁾ ، بواسطة البرنامج GIS وباستعمال أداة (Surface) من مجموعة أدوات تحليل السطوح (Contour) ثم اسقاط نقاط المناحل (الخريطة 4) .

نلاحظ ان أقل ارتفاع لمنطقة الدراسة حوالي (10) م عند بحر النجف يرتفع تدريجياً ليصل لارتفاع (30) م شمال شرق المحافظة لينخفض بشكل متدرج نحو الجنوب الشرقي وصولاً الى (20) م في منطقة هور ابن نجم في ناحية الحرية ويرتفع باتجاه الغرب و الجنوب الغربي باتجاه الهضبة الغربية اذ يتصرف سطح الهضبة بالارتفاع التدريجي نحو الجنوب الغربي إذ

يكون أعلى ارتفاع لها (455 م) فوق مستوى سطح البحر عند التقائه الحدود بين محافظتي النجف و المثنى مع الحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية .

يبين لنا الجدول (2) ان المناھل في المحافظة قد توزعت بشكل متباين على ارتفاعات تراوحت من (10-35 م) ورغم وجود (86.5 %) المناھل ضمن ارتفاع (20-30 م) الا ان ذلك لم يكن السبب الرئيسي في التركز فهناك العديد من المناطق الخالية من النشاط وهي على نفس الارتفاع فضلا عن وجوده في ارتفاعات أخرى متقاربة بشكل عام ، وعليه لا يوجد فروق كبيرة ما بين توزيع المناھل في منطقة الدراسة يؤثر في انشاء المباني وهو بكل الأحوال لا يمكن ان يتسبب بفرق درجات الحرارة .

الخريطة (4) خطوط ارتفاع السطح في محافظة النجف (بالمتر)



المصدر : اعتماداً على خريطة الارتفاع الرقمية (Elevation) ، <http://www.diva-gis.org> ، بواسطة GIS (10,2,1).

الجدول (2) توزيع المناھل في منطقة الدراسة حسب الارتفاع عن مستوى سطح البحر

النسبة المئوية	عدد المناھل	الارتفاع (متر)
2.5	4	15-10
6.5	10	20-15
43.5	67	25-20
35	54	30-25
12	19	40-30
100	154	المجموع

المصدر : - اعتماداً على الخريطة (4)

- توزيع المناھل بحسب مظاهر سطح الأرض : يساعد هذا التوزيع في الدراسات الجغرافية لمعرفة مدى الترابط بين مظاهر سطح الأرض والظاهرة المدروسة، بعد استحداث طبقة أساس (layer) اعتماداً على خريطة الأساس تمثل مظاهر سطح الأرض لمنطقة الدراسة واسقاط المناھل بحسب موقعها ، لظهور خريطة (5) اقسام سطح الأرض والتي تتوزع المناھل فيها بشكل أساس على منطقتين وكما يأتي :

أ- منطقة السهل الرسوبي والتي تمثل في الجانب الشرقي من منطقة الدراسة والتي احتوت على تركز واضح للمناھل في المحافظة اذ ترکز فيها (78%) من المناھل الجدول (3) كان غالبيتها في منطقة أكتاف الأنھار التي تكونت نتيجة لطبيعة الإرساب النهري في الأراضي التي تقع على جوانبه بشكل يفوق الأرضي البعيدة لتشكل شريط من الأرضي المرتفعة حول النهر يتراوح إرتفاعها ما بين (2-3م) عن الأرضي المجاورة لها ⁽¹⁰⁾ ابتداءً من ناحية الحيدرية في محافظة النجف ويقل هذا الإرتفاع بتقدم النهر نحو الجنوب لينخفض في الحيرة والمشخاب إلى 1.5-2م عن الأرضي المجاورة ⁽¹¹⁾.


أما منطقة أحواض الأنھار التي تظهر في المناطق الواقعة بين شطی الكوفة والعباسية من جهة و ضمن مناطق إسقاء الجداول المتفرعة منها من جهة أخرى مكونة (90%) من الأرضي الزراعية في المحافظة ⁽¹²⁾ فهي تحتوي على (13%) من المناھل.

الجدول (3) النسبة المئوية لعدد المناحل بحسب اقسام السطح لمحافظة النجف

المنطقة	المجموع	عدد المناحل	% النسبة
السهل الرسوبي - اكتاف الانهار	120	78	
السهل الرسوبي - منطقة الاحواض	20	13	
الهضبة الغربية - منطقة الوديان	14	9	
المجموع			100

المصدر : - اعتماداً على الخريطة (4)

الخريطة (٥) أقسام سطح الأرض في محافظة النجف



المصدر - اعتماداً على :

- خريطة أقسام السطح لمحافظات الفرات الأوسط ، وزارة الموارد المائية ، الهيئة العامة للمساحة ، قسم إنتاج الخرائط ، ٢٠١٥ ،

2. P.Buringh , Soils and soil conditions in Iraq, H.Veenman and Zonen, N.V.
Netherland, 1960, map 1 .

ب - منطقة الهضبة الغربية الصحراوية :- تضم معظم أراضي منطقة الدراسة ولا سيما قضاء النجف والأجزاء الغربية من قضاء المناذرة وتظهر في منطقة الهضبة الغربية ضمن منطقة الدراسة بعض التضاريس الثانوية أهمها منطقة الوديان السفلية التي تقع ما بين السهل الرسوبي شرقاً ومنطقة الحجارة غرباً ، وتحظى معظم سطحها تكونيات كلسية وجيرية ورملية⁽¹³⁾. وضمت هذه المنطقة (9%) من المناحل في جانبها الشرقي المحاذي للسهل الرسوبي.

أما منطقة الحجارة فهي تتصف بشكل عام بفقر تربتها وبنباتها الطبيعي ومحدودية نشاطها الزراعي⁽¹⁴⁾ وهي تخلي من النشاط موضوع الدراسة . ومن خلال توزيع المناحل بحسب اقسام سطح الارض في المحافظة ظهر انها تقتصر على منطقة السهل الرسوبي بنسبة (91%) تقسّمت على منطقتي كتوف الانهار وأحواضها في حين ضمت الهضبة الغربية (9%) من المناحل في المحافظة تركّزت في هوماش قضاء النجف في منطقتي بحر النجف والاطراف الشرقية لمنطقة الوديان عند طريق نجف كربلاء في حين لم يكن هناك نشاط لتربية النحل في مناطق الاهوار ومنطقة الحجارة لعدم ملائمتها لتربيته.

3- توزيع المناحل بحسب قربها من الموارد المائية :


يعد الماء جزء أساسى من متطلبات الحياة لنحل العسل بشكل مباشر لاحتاجه الجسمانية للماء وكذلك بشكل غير مباشر عبر إسهام المياه في نمو النباتات التي يعتمدها النحل في غذائه ، يستهلك النحل الماء بشكل منفرد أو مما يحتويه الرحيق من رطوبة عالية تقدر ب (60%) من مكوناته بشكل عام⁽¹⁵⁾ ، و يدخل الماء ضمن مكونات العسل فهو يشكل (18-21%) منه ، وحوالي (66%) من مكونات الغذاء الملكي⁽¹⁶⁾.

أما الموارد المائية في منطقة الدراسة فتقسم بحسب مصادرها إلى الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية.

وبما ان منطقة الدراسة تقع ضمن إقليم المناخ الصحراوي الجاف، ذي الأمطار الفصلية القليلة والمتبذبة فإن الأمطار لا يعتمد عليها كمصدر رئيس للمياه سواء لحاجة نحل العسل أو لري المحاصيل الزراعية، فهي ذات قيمة محدودة لا يعول عليها .

أما الموارد المائية السطحية فتتمثل بشكل رئيس بنهر الفرات الذي يدخل منطقة الدراسة عند القسم الشمالي إلى الجنوب من سدة الهندية بحوالي (66 كم) ، إذ يتفرع جنوب مدينة الكفل إلى فرعين رئيين الاول شط الكوفة الذي يبلغ طوله داخل المحافظة (103.2 كم) يزود شبكة من الجداول تزيد على (100) جدول ونهر فرعي تبلغ اطوالها (237.8 كم)⁽¹⁷⁾. الخريطة

(6) الموارد المائية في محافظة النجف



المصدر : خريطة الموارد المائية لمحافظات الفرات الأوسط ، وزارة الموارد المائية ، الهيئة العامة للمساحة ،

قسم انتاج الخرائط ، 2015.م

أما الثاني فهو شط العباسية الذي يبلغ طوله داخل المحافظة (28كم) يتفرع منه حوالي (30).

جدولاً رئيسياً وفرعياً يبلغ مجموع أطوالها (176.5 كم) ⁽¹⁸⁾.

أما المياه الجوفية فهي تكتسب أهميتها كمصدر مائي أما بانفرادها في توفير الماء حيثما تقع المصادر الأخرى مثل الأمطار والمياه السطحية أو بما تساهم به من تغذية مائة لينابيع والآبار والأودية والأنهار والبحيرات الصحراوية ⁽¹⁹⁾، لذا فهي ذات أهمية محدودة جداً في منطقة السهل الرسوبي من منطقة الدراسة لتوفّر المياه السطحية . لكنها تكون المورد الرئيس في منطقة الهضبة الغربية يعكس تأثيره الإيجابي على الزراعة بشكل عام. ولاسيما في الجهات الشرقية من الهضبة الغربية المحاذية لطريق كربلاء - نجف .


ومن خلال استعمال أداة (Buffer) من مجموعة أدوات (Geoprocessing) و اسقاط مواقع المناولات امكن استنتاج من الجدول (4) وخريطة (7) ان (94 %) من المناولات لا تبعد من مصادر المياه أكثر من 1000م والباقي لم تتجاوز مسافة (5000م) ورغم بعدها عن المياه الا انه يتم توفيره لها من خلال ادارة تلك المناولات.

الجدول (4) توزيع المناولات بحسب قربها من مصادر المياه في محافظة النجف

النسبة %	عدد المناولات	المسافة بالمترا
94	145	1000-0
4	6	3000-1000
2	3	5000-3000
100	154	المجموع

المصدر : الباحث باستعمال أداة (Buffer) من مجموعة أدوات (Geoprocessing)

الخريطة (7) توزيع المناحل بحسب القرب من نهر الفرات وفروعه في محافظة النجف الاشرف



المصدر : اعتماد الجدول (4) توزيع المناحل بحسب قربها من مصادر المياه في محافظة النجف

-4- التحليل المكاني :

التحليل المكاني هو عملية معالجة المعلومات الجغرافية لغرض تحصيل معلومات وبيانات جديدة من البيانات الأصلية. عادة ما يأتي التحليل المكاني ضمن تطبيقات نظام المعلومات الجغرافية (GIS) والتي اغلبها في صندوق أدوات (Spatial Analyst) وبحسب الدراسة ومتطلباتها يتم اختيار الأنسب من هذه الأدوات وعليه تم اختيار الاتي :-

1- تحليل الجار الأقرب Nearest Neighbor Analysis:- يعد من أهم أدوات التحليل المكاني في الجغرافية والتي تعتمد على قياس المسافة بين كل نقطة وأقرب نقطة مجاورة لها لتحديد نمط توزيع الظاهرة الجغرافية⁽²⁰⁾.

ويتم استخراج هذا التحليل على وفق المعادلة الآتية ⁽²¹⁾ :- $L = 2m^2 \times n/h$

L = صلة الجوار

m = معدل المسافة الفاصلة بين النقط (المسافة الفعلية)

n = عدد النقط (مركز التوزيع)

h = مساحة الدراسة التي تتوزع في ها النقاط

وقد تم استعمال أداة (Arc GIS) في برنامج (Spatial Analyst) لاستخراج النتائج .

وعلى ذلك يمكن تحديد ثلات أنماط رئيسة من التوزيعات المكانية وعدة أنماط ثانوية قريبة منها وهي⁽²²⁾ :-

نمط التوزيع المتقارب: إذا كان ناتج التحليل أقل من (1) وله ثلات أنماط ثانوية

$0 = متجمع, 0.5 = متقارب متجمع, 0.5 - 1 = متقارب عشوائي$)

نط التوزيع العشوائي: يظهر عندما يكون الناتج يساوي (1) ومن سماته وجود نقاط متقاربة من بعضها وأخرى متباينة أي غير منتظمة.

نط التوزيع المتباين: عندما يكون الناتج بين (1.15-2) وله عدة أنماط ثانوية
2.1 = متباينة غير منتظمة، 2 = متباينة منتظمة، 2.15 = كبيرة المتباين

أما المناحل في محافظة النجف الأشرف فيتضح من الخريطة (7) ان توزيع المناحل في المحافظة قد أخذ نط المتقارب العشوائي إذ بلغت قيمة معامل الجار الأقرب (0.51) بمتوسط مسافات (960م) بين مناحل المحافظة .


2- تحليل اتجاه التوزيع : Directional Distribution

ضمن مجموعة Measuring Geographic Distributions ، تهدف هذه الأداة لتحديد الاتجاه العام لتوزيع النقاط على الخريطة والتي يمكن من خلالها تحديد أكثر دقة لأنماط التوزيع وارتباطها مع الظاهر الأخرى ، يظهر من الخريطة (8) كان الاتجاه العام لهذه المناحل من الشمال إلى الجنوب تأخذ اتجاهًا جنوب شرقي بدرجة بلغت (160.7 درجة) وهي بشكل عام متوازية مع اتجاه نهر الفرات بفرعيه في محافظة النجف (الكوفة والعباسية) .

3- كثافة الظاهرات النقطية : Point Density


يتيح هذا التحليل بيان كثافة توزيع النقاط على الخريطة بحسب القيم المستعملة ضمنها وعليه تم ادخال اعداد الخلايا لجميع مناحل المحافظة ومن خلال مجموعة أدوات spatial Analyst اذ تم تصنيف المناحل الى 11 فئة كثافية اعتماد القاعدة الخاميسية في تحديد الفئات : على وفق القاعدة الآتية (عدد الفئات = $\log_5(\text{العدد})^{(23)}$) والتي نتج عنها خريطة تبين كثافة خلايا النحل في منطقة الدراسة الخريطة (9) .

الخريطة (8) تحليل الجار الأقرب تجاه التوزيع للمناولات في محافظة النجف



المصدر : الباحث جدول (4) باستعمال

الخريطة (9) الكثافة المساحية لأعداد الخلايا للمناصل في محافظة النجف



المصدر : الباحث جدول (4) باستعمال الأداة spatial Analyst tools

الاستنتاج :

بعد ان تم توزيع المناولات بحسب الارتفاع عن سطح البحر تبين ان المناولات في المحافظة قد توزعت بشكل متباين على ارتفاعات تراوحت من (10-35 م) ورغم وجود (86.5%) المناولات ضمن ارتفاع (20-30م) وان ذلك لم يكن السبب الرئيس في التركز فهناك العديد من المناطق الخالية من النشاط وهي على نفس الارتفاع فضلا عن وجوده في ارتفاعات أخرى متقاربة بشكل عام ، اما عندما تم توزيع المناولات بحسب مظاهر سطح الأرض فقد وجد ان المناولات تتوزع فيها بشكل أساس على منطقتين هي منطقة السهل الرسوبي والتي تتمثل في الجانب الشرقي من منطقة الدراسة والتي احتوت على تركز واضح للمناولات في المحافظة اذ تركز فيها (78%) من المناولات كان غالبيتها في منطقة أكتاف الأنهار التي تكونت نتيجة لطبيعة الإرساء النهري في الأرضي التي تقع على جوانبه بشكل يفوق الأرضي البعيدة لتشكل شريط من الأرضي المرتفعة حول النهر يتراوح إرتفاعها ما بين (2-3) م عن الأرضي المجاورة لها ، ومنطقة أحواض الأنهار التي تظهر في المناطق الواقعة بين شطى الكوفة والعباسية من جهة و ضمن مناطق إسقاط الجداول المتفرعة منها من جهة أخرى مكونة (90%) من الأرضي الزراعية في المحافظة⁽²⁴⁾ فهي تحتوي على (13 %) من المناولات، اما عند ما تم توزيع المناولات بحسب قربها من الموارد المائية فتبين بأن المناولات لا تبتعد من مصادر المياه أكثر من 1000م فهي تحتوي (94%) من عدد المناولات اما الباقي فلم تتجاوز مسافة (5000م) عن مصادر المياه السطحية، ورغم بعدها عن المياه الا انه يتم توفيره لها من خلال ادارة تلك المناولات ، ومن خلال تحليل الجار الأقرب فقد تبين بأن توزيع المناولات في المحافظة قد أخذ نمط المتقارب العشوائي إذ بلغت قيمة معامل الجار الأقرب (0.51) بمتوسط مسافات (960م) بين مناولات المحافظة اما اتجاه التوزيع وكثافة الظاهرات النقاطية فقد تبين ان الاتجاه العام اتخذ اتجاهًا جنوبی شرقي بدرجة بلغت (160.7 درجة) وهي بشكل عام متوازية مع اتجاه نهر الفرات بفرعيه في محافظة النجف (الكوفة والعباسية) ، وعليه تكون نتيجة التحليل المكاني قد اكدت صحة الفرضية وان اتجاه توزيع المناولات يتبع مصادر المياه السطحية التي تعد من أهم عوامل الجذب المكاني لنشاط تربية النحل في منطقة الدراسة رغم أهمية المظاهر الأخرى التي تعد تكميلية في استدامة النشاط المذكور .

الهوماش :

- (1) وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، المجموعة الاحصائية السنوية ، 2012-2013م .
- (2) عايد جاسم الزاملي ، تحليل جغرافي لتباین اشكال سطح الأرض في محافظة النجف ، رسالة ماجستير ، كلية الأداب جامعة الكوفة ، 2001 ، ص.3.
- (3) منتظر صباح الحسناوي ، التحليل المكاني لتربية نحل العسل ومنتجاته في محافظات الفرات الأوسط ، رسالة ماجستير ، كلية الاداب-جامعة الكوفة ، 2016 ، ص19.
- (4) جمعية نحالي النجف التخصصية ، بيانات غير منشورة ، 2019 .
- (5) مديرية زراعة محافظة النجف ، قسم وقاية المزروعات ، بيانات غير منشورة ، 2019.
- (6) جمعية نحالي النجف التخصصية ، بيانات غير منشورة ، 2019 .
- (7) منتظر صباح الحسناوي ، كامل حمزة فليفل ، إدارة وتحليل بيانات قطاع تربية النحل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، مجلة المؤتمر السابع لاتحاد النحالين العرب ، مصر - طنطا ، 2014
- (8) وزارة الزراعة ، الهيئة العامة لوقاية المزروعات ، قسم التخطيط و المتابعة ، 2010 .
- (9) اعتماداً على الموقع الالكتروني : <http://www.diva-gis.org/> ، 25-12-2019 .
- (10) عبد الله رزوقي كربيل، زراعة الخضروات ومستقبلها في لواء الحلة، رسالة ماجستير، كلية الأداب، جامعة بغداد، 1967، ص18. عن (محمود بدر السميح ، المقومات الجغرافية لانتاج الالبان في محافظة بابل ، مصدر سابق ، ص46)
- (3) شمخي فيصل الاسدي، تحليل جغرافي لأنماط الزراعية في محافظة النجف ، رسالة ماجستير ، كلية الاداب ، جامعة البصرة ، 1988 ، ص.8.
- (12) المصدر نفسه ، ص 10 .
- (13) خطاب صكار العاني ، نوري خليل البرازى ، مصدر سابق ، ص 31 .
- (14) مهند حسن رهيف الكعبي ، مشكلة التصحر في محافظة المثنى وبعض تأثيراتها البيئية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية - جامعة البصرة ، 2008 ، ص 25 .
- (15) محمد عباس عبد اللطيف و آخرون ، تربية نحل العسل ، كلية الزراعة - جامعة الاسكندرية ،منشأة الشنهاي ، 2004 ، ص88.
- (16) محمد علي البنبي ، نحل العسل في القرآن و الطب ، دار المعرف ، مصر ، ط 2 ، 1995 ، ص172 .
- (17) حمزية ميري كاظم الخزعلی ، مظاهر التصحر في محافظة النجف الاشرف وانعكاساتها على واقع و مستقبل الوضع الزراعي ، رسالة ماجستير ، كلية الاداب - جامعة الكوفة ، 2013 ، ص 92 .
- (18) حمزية ميري كاظم الخزعلی ، مصدر سابق ، ص 92 .
- (19) حسن رمضان سلامة ، جغرافية الاقاليم الجافة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة ،الأردن ، ط 1 ، 2010 ، ص185 .
- (20) صفحون خير ،الجغرافية موضوعها ومناهجها وأهدافها ، دار الفكر ، دمشق ، 2000 ، ص288.
- (21) عبد الجليل ضاري عطا الله ، شذى عبد الرزاق ، التباین المكاني للمطاعم الترفيهية في مدينة الكوت ، مجلة كلية الكوت الجامعة ، المجلد (3) العدد (2)، 2018، ص191.

- (22) عبد الحليم البشير فاروق ، نزهة يقضان الجابري ، تحليل صلة الجوار في الدراسات الجغرافية بالتطبيق على المستوطنات البشرية بمنطقة مكة المكرمة ،مجلة جامعة ام القرى للعلوم الاجتماعية ،المجلد ١ ، العدد ١ ، ٢٠٠٩، ص153.
- (23) فتحي محمد أبو عيانة ، التحليل الاحصائي في الجغرافية البشرية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٨٧ . ص48.
- (24) المصدر نفسه ، ص ١٠ .