



تحليل جغرافي لحالات (التغير،
التدبّب، الاتجاه، التطرف) في
امطار محافظة النجف الاشرف

أ.م.د. مثنى فاضل الوائلي
جامعة الكوفة – كلية الآداب

مستخلص

يهدف هذا البحث الى الكشف عن التغيرات الحاصلة في كميات الامطار الساقطة في محافظة النجف واتجاهاتها العامة ونسب تذبذبها خلال الدورات الخمس الماضية، فضلاً عن تغير شدتها ومواعيده سقوطها وتركيزاتها الشهرية والفصلية السنوية خلال المدة (١٩٦٣-٢٠١٧). مع الاستعانة بمحطات الانواء الزراعية العراقية لمحطات أخرى لإيجاد التباين والانحراف. وتمت الاستعانة بعدد من المعاملات الإحصائية ومنها استعمال معامل جودي وويلكسون للتذبذب المطري، وتم اعتماد السلسلة الزمنية T.S واتجاهاتها العامة لكل الدورات خلال مدة الدراسة. وتطبيق عدد من المعادلات الرياضية في احتساب قيم الجفاف والقيمة الفعلية للأمطار. وشمل البحث أربع مباحث تضمنت:

- ١- التغيرات الدورية في المعدلات الشهرية للأمطار الساقطة في منطقة الدراسة.
- ٢- حالات التباينات الزمنانية للأشهر المطيرة في منطقة الدراسة.
- ٣- التغيرات الدورية في المعدلات السنوية للأمطار الساقطة في منطقة الدراسة.
- ٤- الانحرافات المطيرية بين محطات منطقة الدراسة

توصلنا في هذا البحث الى نتائج مهمة وجديرة بالنظر ومن أهمها وجود تباين مكاني وزمني واضح وحار في كميات الامطار المتساقطة وفي كثافتها واتجاهاتها ومواعيدها. وعدم وجود دورية واضحة او اتجاهها مستمرا في كميات الامطار الساقطة في منطقة الدراسة. مع ذلك فالصفة الالغالب هو اتجاه معظم الامطار نحو التناقص في كمياتها شهريا وسنويما. وان هناك اتجاه عاما وواضحا نحو تناقص كميات الامطار في منطقة الدراسة في جميع أشهر السنة ولجميع الدورات فيما عدا شهري تشرين الأول وتشرين الثاني اذ يلاحظ انهما يشهدان تزايدا للأمطار في الدورات الأخيرة كما في (٢٠٠٧-٢٠١٧). وان اعلى قمم لمعدلات التساقط المطيري الشهرية قد حصلت في الدورة الثالثة (١٩٨٥-١٩٩٥). في حين سجلت أكبر المعدلات الشهرية في شهر كانون الثاني من الدورة الثانية (١٩٧٤-١٩٨٤) بواقع (٤٢٥ ملم).



المقدمة

تتأثر منطقة دراستنا حالها حال أي منطقة من العالم بمجموعة من العوامل والضوابط الثابتة والمتحيرة، وهي عوامل تؤدي بشكل وبآخر في تباين كميات ومواعيد وشدة الامطار الساقطة مكانياً وزمانياً، ومن بين ابرز تلك العوامل الموقع الفلكي لمنطقة الدراسة الداخلي القاري بعيد عن المسطحات المائية... كما ان للعوامل المحلية كالتضاريس القليلة الارتفاع والمسطحات الخضراء الصغيرة والقليلة جداً مقارنة مع مساحة منطقة الدراسة الكبير جداً ناهيك عن شكل السطح وطبيعته الصحراوية الرملية الهضبية الجافة وقلة المسطحات المائية وصغر حجمها.. فضلاً عن خصائص العناصر المناخية الأخرى لاسيما درجات الحرارة والرطوبة النسبية، وكلها عوامل تحكمت بشكل وبآخر في تباينات وتفاوتات وشذوذ وتذبذب وتطرف في كميات الامطار ومواعيد سقوطها.

لقد شغل هذا الموضوع الحيوي ولا زال يشغل بال العديد من المهتمين من باحثين وعلماء وب مختلف التخصصات العلمية ومنهم المناخيين. ولاسيما مع ما يحصل في العالم ومنه منطقة دراستنا من تغيرات وتذبذبات وتباينات مكانية وزمانية واضحة في كميات الامطار ومواعيد سقوطها وتكراراتها. حتى بات امراً حقيقة محيراً في شكله او اتجاهاته.

ان تباين الامطار الساقطة في منطقة الدراسة تبايناً حاداً مكانياً وزمانياً - سواء اكان ذلك يومياً ام شهرياً ام فصلياً ام سنوياً وحتى دورياً، نتيجة لتباين تكرار وحجم وامتداد عدد من العوامل المتحكمة فيها سواء ا كانت ضوابط حرارية كالمنخفضات الجوية والتي تعد أكثر العوامل المتحكمة في امطار المنطقة، او المنظومات الضغطية المتباينة أيضاً او في نوع وخصائص الكتل الهوائية المؤثرة في مناخ منطقة الدراسة. فهو امراً يستدعي الوقوف عنده بشكل معمق دراسة وبحثاً.

يشير خبراء المناخ الى ان التغييرات الناتجة عن النشاط البشري تزيد من مخاطر حصول الجفاف وقلة تساقط التلوج وارتفاع مستوى البحار وان يستمر مفعول تغيرات لمناخ الناتجة عن نشاطات الإنسان على مدى قرون وبفعل ابعاث غازات الاحتباس الحراري. اذ تعمل الملوثات في احداث تأثيرات سيئة على المكونات الرئيسية للغلاف الجوي خاصة مع توسيع ثقب الأوزون الذي نتج عنه زيادة مرور الأشعة فوق البنفسجية نحو الأرض وحدوث



ظواهر طقسية ومناخية كارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها وظاهرتي الانحباس الحراري والانقلاب الحراري وما يرافقها من ظواهر طقسية مختلفة.^(١)

لقد عانت أغلب مناطق العالم ومنه منطقة الدراسة من تناقص وتدبّب واضح في الأمطار الساقطة، اذ ضربت موجات الجفاف آسيا وأوربا وغيرها في أوقات متقارنة من السنين الماضية، وشملت مناطق عديدة من العالم واستمرت إلى يومنا الحاضر، وان (الأردن والعراق وسوريا) مثلاً واضحًا على الجفاف الذي ضرب آسيا في المدة (١٩٩٩-٢٠٠٠).^(٢) كما وبينت نتائج النماذج المناخية أن منطقة شرق المتوسط ومنها منطقة الدراسة قد تشهد انخفاضاً في كمية التساقط نتيجة زيادة غاز (CO_2) في الجو، وان زيادة درجة الحرارة بين (٤-٦ م°) سيؤدي إلى زيادة التبخر الكامن بحدود (٣٠٠-١٢٠ ملم).^(٣) وأشار المركز القومي الأمريكي للأبحاث إلى امتداد ظاهرة الجفاف لتشمل معظم أنحاء العالم ومنها منطقة الدراسة، بفعل الغازات الدفيئة، وأن العالم يعاني من أوضاع جفاف شديد وصلت بنسبة (%)٣٠ بحسب (دليل بالمر للجفاف) عام (٢٠٠٢) بعد أن كانت (١٥%) في أوائل سبعينيات القرن الماضي بسبب ازدياد درجة الحرارة.^(٤)

تتعرض نحو (%)٣٠ من الأراضي من التصحر بسبب تعرضها للجفاف في (١٥٠ دولة).^(٥) ويحظى العراق بالمرتبة العاشرة في قائمة الدول التي تتعرض للتتصحر، وان نحو (%)١ من مساحة الأراضي الزراعية تتملح سنويًا، فضلاً عن ذلك فقد كان لعوامل تجفيف الأرضي المغمورة بالمياه في مناطق وسط العراق والتي تصل إلى أكثر من (٢٠٠٠٠ كم^٢) أو ما يعادل (%)٩٠ من مساحتها قد تعرضت إلى حالات من التصحر نتيجة اختلال التوازن في النظام البيئي، كما كان للخصائص المناخية الجافة تأثيراً كبيراً في المساحات الزراعية في منطقة الدراسة، إذ يظهر هذا التأثير في نسبة (%)٧٠ من الأراضي الزراعية في بلدنا لاسيما في منطقتي السهل الرسوبي والهضبة الغربية، والتي تعاني من قلة كمية الأمطار، كما أنها تسهم في جفاف التربة وتملحها ومن ثم استفحال مظاهر التصحر كالغبار والثبات الرملية.^(٦)

أولاً - مشكلة البحث:

تدور مشكلة بحثنا حول الاستفهام الآتي (ما طبيعة وحجم حالات التغير، التدبّب، الاتجاه، التطرف التي تحصل في الأمطار الساقطة في محافظة النجف الاشرف).؟



ثانيا - فرضية البحث:


يفترض الباحث ان هناك حالات متباينة زمانياً ومكانياً في تغير وتذبذب الامطار الساقطة في محافظة النجف الاشرف وقد تكون بشكل اتجاه ما - او قد تسلك حالة من التطرف الزمانية في أوقات معينة.

ثالثا- هدف البحث:

يهدف البحث الى الكشف عن التغيرات الحاصلة في كميات الامطار الساقطة في محافظة النجف الاشرف واتجاهاتها العامة ونسب تذبذبها خلال الدورات الخمس الماضية، فضلاً عن تغير شدتها ومواعيد سقوطها وتركيزاتها الشهرية والفصلية والسنوية خلال المدة (١٩٦٣-٢٠١٧).

رابعا - حدود البحث:

تقع محافظة النجف فلكياً بين دائري عرض (٣٢° - ٥٠° شماليًّاً وبين قوسياً طول (٤٤° - ٤٢° شرقاً، أي وإنها تقع ضمن مناطق الفيض الحراري في العالم. ويبين الشكل (١) إن المحافظة تقع في الجزء الجنوبي الغربي من العراق، ويأخذ شكلها امتداداً شمالياً شرقياً - جنوبياً غربياً بشكل قريب من الاستطاله، يشكل ضلعها القصير الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية، ويحدها من الشمال محافظتي بابل وكرلاء، ومن الشرق محافظتي القادسية والمثنى ومحافظة الأنبار غرباً. وتوجد في المحافظة (٤) محطات المناخية واحدة ائلية و٣ زراعية هي محطات (النجف، العباسية، المشخاب، شبجة). أما الحدود الزمانية فقد تم اعتماد البيانات لمحطة النجف في المدة (١٩٦٣-٢٠١٧) في حين جاءت البيانات للمحطات المناخية الزراعية للمدة (٢٠١٣-٢٠١٧).

(١) خريطة منطقة الدراسة.^(٧)

خامسا - المعاملات الإحصائية:

- ١- تم تقسيم الامطار الساقطة في منطقة الدراسة خلال المدة (١٩٦٣-٢٠١٧) إلى خمسة دورات مناخية لكل دورة (١١ سنة). ومتابعة الاتجاه العام لكل دورة شهريا، فضلا عن بيان التغيرات والانحرافات الحاصلة بين كل دورة وأخرى، شهريا وسنويًا.
- ٢- تم استعمال معامل جودي وويلكسون للتذبذب المطري: $\% = \text{انحراف المعياري}/\text{معدل المطر} * 100$.^(٨)
- ٣- تم اعتماد السلسل الزمنية T.S واتجاهاتها العامة لكل الدورات خلال مدة الدراسة.
- ٤- تم اعتماد عدد من المعادلات الرياضية في احتساب قيم الجفاف والقيمة الفعلية للأمطار.
- ٥- اعتماد معامل الجفاف لديمارتون $y=p/t+10$.^(٩) ويشير الى ان المناخ جاف اذا كانت النتيجة اقل من ٥.





المبحث الأول

التغيرات الدورية في المعدلات الشهرية للأمطار الساقطة في منطقة الدراسة

يشير المخطط (٢) الى ان هناك اتجاه عام واضح نحو تناقص كميات الامطار في منطقة الدراسة في جميع أشهر السنة ولجميع الدورات فيما عدا شهري تشرين الأول وتشرين الثاني اذ يلاحظ انهما يشهدان تزايداً للأمطار في الدورات الأخيرة لاسيما (٢٠١٧-٢٠٠٧)، كما يظهر ان أعلى قمم لمعدلات التساقط المطري الشهرية قد حصلت في الدورة الثالثة (١٩٨٥-١٩٩٥). في حين سجلت أكبر المعدلات الشهرية في شهر كانون الثاني من الدورة الثانية (١٩٧٤-١٩٨٤) بواقع (٢٥,٤ ملم). وخلاصة التغير المبينة في المخططات أدناه هو انتقال تدريجي ملفت للنظر للأشهر المطيرة من كانون الأول والثاني إلى تشرين الأول والثاني - وهذا امر واضح وغريب ومعه يتوقع ان تحصل العديد من التغيرات في باقي عناصر المناخ وظواهره وما يرتبط بها من عناصر البيئة ومكوناتها. بلغ اكبر تغير عكسي في شهر كانون الثاني بمعدل تغير (-٤,٣ ملم) في حين بلغ اقصى معدل للتغير الطردي في شهر تشرين الثاني (١,٦ ملم) خلال التغيرات انهة الذكر.

مخطط (٢) الاتجاهات العامة للسلسل الزمنية لمعدلات كميات الامطار الشهرية لكل دورة.





المبحث الثاني


حالات التباينات الزمنية للأشهر المطيرة في منطقة الدراسة

١- اعداد الأشهر المطيرة:

تبين اعداد الأشهر التي تسقط فيها الامطار في منطقة الدراسة تبايناً واضحاً، اذ يشير المخطط (٣) الى اقل السنوات التي شهدت فيها مدة الدراسة أشهراً مطيرة (أكثر من ١ ملم) هي شهرين فقط عام (١٩٦٤) وسجلت ٣ اشهر في عامي ١٩٩٠ من الدورة الثالثة وعام ١٩٩٨ من الدورة الرابعة. في حين سجل اعلى عدد للأشهر المطيرة (٨ شهراً) ثلاث مرات في الدورة الثانية (١٩٧٤-١٩٨٤) وهي المدة التي شهدت أكثر معدل لعدد الأشهر المطيرة (٦,٥ شهراً)، كما انها أكثر الدورات مطراً (١١٣,٤ ملم)، فيما سجلت مرة أخرى لأكثر الأشهر عدداً عام ٢٠١٥ من الدورة الخامسة. وعموماً فإن معدل عدد الأشهر التي تسقط فيها امطار في منطقة الدراسة أكثر من (١ملم) لا يتجاوز ٦ أشهر.



مخطط (3) اعداد الاشهر المطيرة لكل سنة من مدة الدراسة 1963-2017 في محافظة النجف



٢- تكرارات الأشهر المطيرة:

يشير الجدول (١) الى تباين مكاني وزمني واضح جدا في كميات الامطار الساقطة في منطقة الدراسة خلال الـ ٥٥ سنة الماضية، عموما سجلت اعلى كمية تساقط مطري شهري في شهر تشرين الثاني وحصل ذلك عام ٢٠١٣ مع ان هذا الشهر هو البداية الحقيقية للموسم المطري في منطقة الدراسة، كما ان أكثر الأشهر التي لا تسقط فيها امطار هو شهر تشرين الأول اذ تكررت حالات الجفاف (٣١ مرة) يليه شهر مايس (١٦ مرة) في حين كانت الأشهر الأقل جفافا هي كانون الثاني وشباط (٣ مرات)، كما ان شهر شباط هو الشهر الأكثر تكرارا في تسجيل حالات اكثرب من المعدل (٦ مرات). عموما فقد بلغ المتوسط المطري في المنطقة بحدود (٣٧.٩ ملم) وان نحو (٤٠.٦ مرات) تتكرر فيها المعدلات الأقل من المعدل مقابل (١٠.٦ مرات) هي معدلات تكرارات الأشهر الجافة، يقابلها (٣.٨ مرات) فقط هو معدل تكرار الأشهر فوق المتوسط العام لأمطار منطقة الدراسة.

جدول (١) اعداد الاشهر المطيرة والجافة وضمن الحدود المطرية الشهيرية لكل سنة / ملم في منطقة الدراسة.


الأشهر	اعلى مطر	اقل مطر	متوسط مطري	الجافة تماما	اعلى من المعدل (رطبة)	اقل من المعدل (جافة)	مج
JAN.	94.1	0.2	47.15	3	3	49	55



الأشهر	اعلى مطر	اقل مطر	متوسط مطري	الجافة تماما	اعلى من المعدل (رطبة)	اقل من معدل (جافة)	مج
FEB.	74.4	0.7	37.55	3	6	46	55
MAR.	80.5	0.1	40.3	7	3	45	55
APR.	89.9	0.2	45.05	10	2	43	55
MAY.	47.1	0.2	23.65	16	2	37	55
OCT.	38.4	0.3	19.35	31	5	19	55
NOV.	103.3	0.2	51.75	9	5	41	55
DEC.	77.1	0.1	38.6	6	4	45	55
AV	75.6	0.3	37.9	10.6	3.8	40.6	/

اما ما يتعلق بقيمة التغير في انحدار الامطار المتساقطة خلال مدد الدراسة فيشير المخطط (٤) الى تباين واضح جدا في قيم التغير بين كل مدة وأخرى وعموماً فان أكبر تنافص في معامل التغير السنوي حصل في الدورة الثانية وبمقدار تغير (-٢.٢) في حين شهدت الدورة الأولى أكبر معاملات التغيرات المطرية الموجبة (٥.٦) تليها الدورة الأخيرة (٢٠٠٧-٢٠١٧).

مخطط (٤) معاملات التغير لانحدار الامطار المتساقطة لكل دورة في منطقة الدراسة






المبحث الثالث

التغيرات الدورية في المعدلات السنوية للأمطار الساقطة في منطقة الدراسة

١- التغيرات السنوية المطرية:

يصل المعدل العام لكميات الامطار الساقطة في منطقة دراستنا (٩٤,٢ ملم) وهي عموما تتخذ شكلا متباينا من التغير والتذبذب، في كمياتها ومواسم سقوطها، اذ يظهر المخطط (٥) الى ان هناك اتجاهها عاما نحو تناقصا لكميات الامطار السنوية خلال الدورات الخمس بمعدل (-٤,١٢ ملم سنويا)، وسجلت اعلى كميات الامطار خلال الدورة الثانية (١٩٧٤-١٩٨٤) نحو (١١٣,٤ ملم) وبزيادة عن المعدل العام (١٩,٢ ملم) وبمعامل اختلاف (12%) اذ سجلت هذه الدورة اعلى انحراف معياري عن المعدل العام (١٣,٦). تاليها الدورة الثالثة (١٩٨٥-١٩٩٥) وفي حين سجل اكبر تغير سلبي عن المعدل العام في الدورة الخامسة (٢٠١٧-٢٠٠٧) بمعامل اختلاف (14,٩%) وبمقدار تراجع عن المعدل العام (-١٦,٤ ملم) اذ سجلت هذه الدورة اقل كمية امطار ساقطة في عموم دورات الدراسة (٧٧,٨ ملم). مما يشير الى ان امطار منطقة الدراسة تتجه نحو التناقص على الرغم من زيادة سقوط الامطار في سنوات معينة، وهذا يرتبط بمجموعة العوامل آنفة الذكر فضلا عن تأثيرها بما يحصل في العالم من تغيرات مناخية لسنا بمعزل عنها. جدول (٢).

مخطط (٥) المجاميع السنوية للأمطار في منطقة الدراسة لكل مدة واتجاهها العام



المصدر: بالاعتماد على ملحق (١).



جدول (٢) الانحراف والتغير في كميات الامطار الساقطة بين الدورات مقارنة مع المعدل

العام.^(١)

الدورات	كمية الامطار / ملم	الانحراف المعياري عن الدورة اللاحقة s	الانحراف عن المعدل العام s	معامل الاختلاف c.v % عن المعدل العام	مقدار التغير عن المعدل العام / ملم
دورة ١	84.3	20.6	7	8.3	-9.9
دورة ٢	113.4	2.1	13.6	12	19.2
دورة ٣	110.4	17.8	11.5	10.4	16.2
دورة ٤	85.2	5.2	6.3	7.4	-9
دورة ٥	77.8	-	11.6	14.9	-16.4
المعدل	94.2	11.4	10.0	10.6	-

٢- الاتجاهات العامة للسلسل الزمنية لدورات الامطار الساقطة.

يشير المخطط (٦) الى تذبذبات واضحة في كميات الامطار المتتساقطة سنويا في منطقة الدراسة وعلى الرغم من الاتجاه العام المتباين لها فهي تحوي على قيم عليا ودنيا متباينة أيضا في كمياتها وسنواتها، وعموما فان اغلب الدورات تتجه نحو زيادة يمكن التعبير عنها بانها غير حقيقية فيما عدا الدورة الثالثة (١٩٧٤-١٩٨٤) التي تشير الى تناقص مطري بمعدل سنوي (-٤ ملم) في حين ان مقدار الزيادة في الدورة الأولى (٥,٦ ملم) اما الدورة الثالثة (١٩٨٥-١٩٩٥) فان سبب تسجيل الزيادة الطفيفة هو تسجيل العام ١٩٩٣ اكبر كمية امطار ساقطة خلال مدة الدراسة (١٧٠ ملم) في حين شهدت الدورة الرابعة (١٩٩٦-٢٠٠٦) اتجاه نحو الزيادة




بسبب سقوط اكبر تساقط مطري في عموم منطقة الدراسة ومدتها اطلاقا (١٩٠,٧ ملم) عام ٢٠٠٦.


كما تباينت كميات الامطار في سلسلة الدورة الأخيرة (٢٠١٧-٢٠٠٧) وبمعدل زيادة لا يتجاوز (٥,١ ملم) وعموما سجلت اعلى كميات الامطار في سنتين فقط (٢٠١٣ و ٢٠١٥) وبكميات (١٥٦,١ و ١٣٩,٧ ملم) وعلى التوالي.

مخطط (٦) الاتجاهات العامة للسلسل الزمنية لدورات الامطار الساقطة في محافظة النجف.^(١٢)


الدورة الاولى 1963- 1973




الدورة الثانية 1974 - 1984



الدوره الثالثه 1985 - 1995



الدوره الرابعة 1996- 2006



الدوره الخامسه 2007- 2017



يشير الجدول (٣) الى تباين واضح في معدلات الكثافة المطرية اليومية والشهرية، وعموما سجل اعلى معدل للكثافة اليومية في الدورة الثانية (١٩٨٤-١٩٧٤) وبمعدل (٠,٣١ ملم/يوم) لتسجل اعلى الكثافات المطرية في منطقة الدراسة في السنتين (١٩٧٤ و ١٩٨٢) بواقع



(٤٦) ٠، ملم/يوم)، في حين شهدت الدورة الأخيرة (٢٠١٧-٢٠٠٧) أقل معدلات الكثافة المطرية (٢١، ٠، ملم / يوم) وفيها سجلت أقل معدلات اليومية للكثافة المطرية (١، ٠، ملم / يوم) في سنوي ٢٠٠٧ و ٢٠١٧ وهي أقل كثافة مطرية في عموم مدة الدراسة.

اما شهريا فجاءت الكثافة المطرية متوافقة مع ما سجل يوميا اذ سجل اعلاها في الدورة الثانية (٩، ٥ ملم / شهر) واقلها في الدورة الأخيرة (٦، ٥ ملم / شهر) مما يعني ان منطقة الدراسة تعاني من تراجع واضح في كثافتها المطرية يوميا وشهريا، شكل (٧).


جدول (٣) معدلات الكثافة المطرية اليومية والشهرية في منطقة الدراسة/ ملم - ١٩٦٣-٢٠١٧ (١٣)

شهرية	يومية	YEAR												
3.0	0.1	2007	7.6	0.25	1996	4.9	0.16	1985	13.9	0.46	1974	2.8	0.09	1963
5.2	0.17	2008	11.9	0.39	1997	9.8	0.32	1986	12.1	0.4	1975	2.5	0.08	1964
5.0	0.16	2009	7.0	0.23	1998	13.3	0.44	1987	8.8	0.29	1976	5.4	0.18	1965
4.2	0.14	2010	4.1	0.13	1999	12.8	0.42	1988	9.5	0.31	1977	6.7	0.22	1966
5.9	0.2	2011	4.6	0.15	2000	9.4	0.31	1989	4.5	0.15	1978	12.1	0.4	1967
4.1	0.13	2012	6.3	0.21	2001	2.5	0.08	1990	7.6	0.25	1979	8.3	0.27	1968
13.0	0.43	2013	5.4	0.18	2002	7.5	0.24	1991	9.7	0.32	1980	5.1	0.17	1969
8.3	0.27	2014	5.3	0.17	2003	9.3	0.31	1992	4.7	0.15	1981	11.5	0.38	1970
11.6	0.38	2015	4.3	0.14	2004	14.2	0.47	1993	14.1	0.46	1982	8.3	0.27	1971
7.9	0.26	2016	6.0	0.2	2005	12.3	0.4	1994	10.0	0.33	1983	9.2	0.3	1972
3.2	0.1	2017	15.9	0.52	2006	5.3	0.18	1995	9.1	0.3	1984	5.5	0.18	1973
6.5	0.21	AV	7.1	0.23	AV	9.2	0.3	AV	9.5	0.31	AV	7.0	0.23	AV



مخطط (7) معدلات الكثافة المطرية في منطقة الدراسة بحسب الدورارت

٢٠١٧-١٩٦٣



المصدر بالاعتماد على جدول (٣).


المبحث الرابع

الانحرافات المطرية بين محطات منطقة الدراسة

يشير المخطط (٨) الى تباين مكاني وزماني واضح في كميات الامطار المتتساقطة في منطقة الدراسة، اذ تتحصر الفروقات المطرية بين اكبرها عن المعدل العام والمسجل في محطة شبجة في شهر تشرين الثاني (١٢,٦ ملم) وبين اقلها (٠,٢ ملم) وهو اقل ما سجل في نفس المحطة في شهر كانون الأول . في حين كانت الانحرافات نحو الزيادة في عن المعدل العام اعلاها في شهرين تشرين الثاني وكانون الأول في محطة النجف وبزيادة (٥ ملم) عن المعدل العام. فيما سجلت اقل زيادة عن المعدل العام في محطة العباسية في شهر كانون الثاني (٠,٤ ملم) عن المعدل العام المسجل في منطقة الدراسة ومدتها.




مخطط (8) مقدار الفروق المطرية / ملم بين محطات منطقة الدراسة مقارنه مع المعدل العام لها للندة 2013-2017




تبين الانحرافات المطرية في منطقة الدراسة مكانيا وزمانيا أيضا، وعموما سجلت
مجمل منطقة الدراسة انحرافات سالبة عن المجموع المطري العام في محطات منطقة الدراسة،
وسجل اعلى انحراف عن المجموع العام في محطة النجف (-٤٩,٥ ملم) في شهر تشرين
الأول، في حين سجل اقل انحراف وفي نفس الشهر في محطة شبقة (-٦,٣ ملم) وهذا ما يؤكد
تذبذب امطار منطقة الدراسة مكانيا وزمانيا.

مخطط (8) الانحرافات المطرية عن المجموع العام % في منطقة الدراسة ٢٠١٧-٢٠١٣



معاملات الجفاف في دورات منطقة الدراسة:

تبين حالات الجفاف في منطقة الدراسة نتيجة لتبين معدلات درجات الحرارة والامطار المتساقطة.^(١٤) ويشير المخطط (٩) الى ان اكثـر الدورات جفافا في منطقة الدراسة هي الدورة الأخيرة (٢٠٠٧-٢٠١٧) بمعامل جفاف (٢,٢) تليها الدورة السابقة لها (٢,٤). يذكر انه سجلت اقل السنوات جفافا خلال مجمل المدة في منطقة الدراسة عام ٢٠٠٦ شبة جافة (٥,٤) تليها سنة ١٩٩٣ (٥,٢) وعام ١٩٨٢ (٥)، وهي اكثـر السنوات مطرا في المنطقة. في حين كانت اكثـر السنوات جفافا في منطقة الدراسة ١٩٦٤ و ١٩٩٠ بواقع (٠,٩) و ٢٠٠٧ و ٢٠١٧ بمعامل جفاف (١).^(١٥)





النتائج

- ١- وجود تباين مكاني و زمني واضح وحار في كميات الامطار المتساقطة وفي كثافتها واتجاهاتها ومواعيدها.
- ٢- عدم وجود دورية واضحة او اتجاهها مستمرا في كميات الامطار الساقطة في منطقة الدراسة. مع ذلك فالصنف الاغلب هو اتجاه معظم الامطار نحو التناقص في كمياتها شهريا وسنويما.
- ٣- ان هناك اتجاه عاما وواضحا نحو تناقص كميات الامطار في منطقة الدراسة في جميع أشهر السنة ولجميع الدورات فيما عدا شهري تشرين الأول وتشرين الثاني اذ يلاحظ انهم يشهدوا تزايداً للأمطار في الدورات الأخيرة كما في (٢٠١٧-٢٠٠٧).
- ٤- ان أعلى قمم لمعدلات النساقط المطري الشهرية قد حصلت في الدورة الثالثة (١٩٨٥-١٩٩٥). في حين سجلت أكبر المعدلات الشهرية في شهر كانون الثاني من الدورة الثانية (١٩٧٤-١٩٨٤) بواقع (٤٥ ملم).

الملاحق

ملحق (١) كميات الامطار الساقطة / ملم في محافظة النجف (١٩٦٣-٢٠١٧)

مجموع	DEC.	NOV.	OCT.	SEP.	AUG.	JUL.	JUN.	MAY.	APR.	MAR.	FEB.	JAN.	YEAR
33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	3.7	8.6	1.8	9.0	1963
29.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.1	26.2	0.0	1964
64.4	0.0	18.3	1.1	2.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	41.0	1965
79.9	1.3	1.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	6.9	12.1	15.8	1966
144.7	17.9	64.3	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	1.4	2.2	25.9	12.5	1967
99.5	1.5	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	41.1	0.0	0.0	2.4	1968
61.1	7.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	1.1	1.3	30.0	1969
138.1	7.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	26.7	94.1	1970
99.6	14.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	5.2	3.1	13.9	1971
110.7	9.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	21.9	53.1	3.0	11.1	1972
65.4	48.8	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	0.0	1.1	7.0	1973
84.3	9.8	10.5	4.4	0.2	0.0	0.0	0.0	7.6	13.9	7.2	9.2	21.5	AV
166.5	10.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	6.5	80.5	41.6	24.8	1974
145.4	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	21.1	0.0	38.9	52.4	1975
105.5	5.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	9.2	22.6	27.0	35.3	1976
113.6	33.6	8.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.2	9.8	11.7	40.8	1977
53.7	37.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.8	7.8	1978
91.2	11.1	7.7	3.9	0.0	0.0	0.0	2.0	1.2	0.0	23.5	1.4	40.4	1979



مجموع	DEC.	NOV.	OCT.	SEP.	AUG.	JUL.	JUN.	MAY.	APR.	MAR.	FEB.	JAN.	YEAR
116.4	9.0	21.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.4	3.7	74.4	4.1	1980
56.0	8.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	7.5	14.5	1981
169.7	7.8	8.3	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	35.1	9.5	14.4	48.7	1982
119.9	45.4	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	31.0	4.3	2.1	1.0	1983
109.5	13.7	55.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.5	12.6	0.7	9.3	1984
113.4	18.8	10.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.2	8.0	9.7	17.8	20.0	25.4	AV
58.8	19.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.4	13.2	1.7	19.5	1985
117.7	0.2	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	9.2	15.4	45.4	6.0	1986
159.3	77.1	16.5	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.6	7.8	0.0	1987
153.0	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	30.7	13.5	34.6	1988
112.3	0.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	31.6	64.5	3.2	1989
30.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	18.1	8.9	1990
89.4	12.2	4.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	17.4	41.3	6.1	1991
111.9	25.9	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	13.7	19.5	6.2	3.5	1992
170.0	2.1	10.5	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	89.8	0.5	23.5	34.7	1993
147.6	23.1	62.2	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.2	8.1	3.5	27.0	1994
64.1	5.5	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	23.8	8.7	17.0	2.6	1995
110.4	17.8	16.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	16.9	17.7	22.0	13.3	AV
91.3	3.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.7	25.1	14.3	40.0	1996
142.9	26.9	53.9	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.1	10.9	0.7	12.8	1997
83.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	18.4	32.5	1998
48.8	12.1	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	7.8	19.2	1999
54.6	10.0	25.8	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.3	1.6	10.0	2000
75.0	19.3	2.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	25.7	4.0	9.9	12.1	2001
64.2	12.4	5.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	23.3	9.3	4.5	5.0	2002
63.1	20.4	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.0	0.4	0.0	4.0	2003
51.4	1.7	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	4.4	1.0	1.2	24.8	2004
71.4	2.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	12.4	12.8	9.7	27.7	2005
190.7	44.1	27.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	36.6	0.0	43.3	25.5	2006
85.2	13.8	14.9	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	11.2	9.1	10.1	19.4	AV
35.9	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	2.4	12.4	2007
62.1	9.5	0.5	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.2	0.5	1.0	19.6	2008
59.7	4.9	5.1	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	16.8	19.5	5.8	0.0	2009
50.3	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	13.4	5.9	14.8	2.7	2010
71.3	1.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	21.9	4.8	19.8	21.8	2011
48.8	21.9	15.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.2	2.8	3.9	0.2	2012
156.1	0.1	103.3	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	3.2	27.6	2013
99.9	1.8	16.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	26.3	2.6	37.7	2014
139.7	32.7	46.6	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.6	3.4	5.5	4.8	2015
94.2	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	23.8	29.1	5.7	2016
37.8	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	14.7	6.6	4.4	2.7	2017
77.8	10.8	17.8	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	8.8	8.5	8.4	12.3	AV



عدد فصلية
ال ISSN: ٢٠١٧-٢٠١٣

ملحق (٢) كميات الامطار الساقطة / ملم في محطات العباسية وشجرة والمشخاب (١٧-٢٠١٣)

Month	عباسية						شجرة						مشخاب					
	2013	2014	2015	2016	2017	AV	2013	2014	2015	2016	2017	AV	2013	2014	2015	2016	2017	AV
Jan	-	43.1	2.3	6.1	3.2	13.7		22.0	1.1	18.7	2.2	11.0	23.3	26.8	2.6	10.2	2.3	13.0
Feb	-	8.2	3.7	28.2	2.3	10.6	-	4.0	4.4	18.1		8.8	2.0	4.8	6.0	37.4	0.7	10.2
Mar	-	37.2	6.8	18.8	10.4	18.3	-	19.4	10.5	13.9	19.9	15.9	0.0	19.6	2.8	19.4	9.2	10.2
Apr	0.0	9.9	2.4	4.8	12.9	6.0	-	5.0	2.6	3.0	5.3	4.0	0.0	7.6	2.0	-	8.6	4.6
May	15.5	0.3	8.1	0.3	8.7	6.6	-	2.3	-	1.0	0.0	1.1	8.7	0.6	1.9	-	0.1	2.8
Jun	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0
Jul	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0
Aug	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0
Sep	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0
Oct	0.0	2.1	22.6	0.0	0.0	4.9	0.0	-	4.5	0.0	0.0	1.1	0.0	2.3	8.8	-	0.0	2.8
Nov	121.1	14.4	31.3	0.0	5.1	34.4	42.8	0.0	26.5	0.4		17.4	76.3	10.1	40.0	-	6.2	33.1
Dec	0.4	2.0	21.8		0.0	6.1	0.4	1.8	19.3	8.4		7.5	0.2	0.5	17.3	-	0.1	4.5
sum	137.70	117.2	99.10	58.20	42.60	90.96	43.20	54.50	68.90	63.50	27.4	51.5	110.5	72.3	81.4	67.0	27.2	71.7

هواش البحث ومصادره:

- (١) ينظر: علي صاحب الموسوي ومثنى فاضل علي، التغيرات المناخية في الغلاف الجوي وتأثيراتها الحيوية على الكائنات الحية، مجلة البحوث الجغرافية، العدد ١٠، ٢٠٠٨، ص ٣٨.
- (٢) خلف حسين علي الدليمي، الكوارث الطبيعية والحد من اثارها، دار صفاء، عمان، ٢٠٠٩، ص ١٩٧.
- (٣) إبراهيم العرود، التغير المناخي في الميزان، ط١، عمان، ٢٠٠١، ص ٢٣٣.



- (٤) خلف حسين علي الدليمي، مصدر سابق، ص ٢٠١.
- (٥) ليلى أنيس جاد عبد الرحمن، التغيرات المناخية وتداعياتها على التنمية، مكتبة الأسرة، ٢٠٠١، ص ٤٣.
- (٦) علي صاحب طالب الموسوي، ظاهرة التصحر مشكلة بيئية خطيرة (دراسة جغرافية لأسبابها وإبعادها عالمياً وقطرياً)، مجلة البحوث الجغرافية، العدد ٩، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، ٢٠٠٨، ص ٤٣.
- (٧) بالاعتماد على: وزارة الموارد المائية، المديرية العامة للمساحة، بغداد ٢٠١٧ وباستخدام برنامج ArcGIS 10.5
- (٨) للمزيد ينظر: محمود حسن المشهداني، عبد الرزاق البطحي، أبراهيم محمد حسون القصاب، الأحصاء الجغرافي، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، ١٩٧٩، ص ٨٠.
- (٩) عبد العزيز طريح شرف، الجغرافية المناخية والنباتية، ج ١، ط٥، القاهرة، ص ٢٧٦. وينظر: فاضل الحسني ومهدى الصناف، أساسيات علم المناخ التطبيقي، جامعة بغداد، ١٩٩٠، ص ٩٤.
- (١٠) بالاعتماد على ملحق ١.
- (١١) بالاعتماد على ملحق ١.
- (١٢) بالاعتماد على ملحق ١.
- (١٣) الكثافة المطرية = كمية الامطار / المدة الزمنية.. بالاعتماد على ملحق ١.
- (١٤) تم اعتماد معادلة ديمارتون للجفاف انفة الذكر - وتشير الى حاصل قسمة الامطار على درجات الحرارة ١٠+ اذ يكون المناخ جافا اذا كانت قيمة المعادلة اقل من ٥. للمزيد ينظر: فتحي عبد العزيز ابوراضي، الأصول العامة في الجغرافية المناخية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ٢٠٠٦، ص ٢٧٩.
- (١٥) بالاعتماد على: وزارة النقل، الهيئة العامة للأحوال الجوية والرصد الزلزالي، بيانات غير مشورة، بغداد، ٢٠١٨.
- (١٦) وزارة النقل، الهيئة العامة للأحوال الجوية والرصد الزلزالي، بيانات غير مشورة، بغداد، ٢٠١٨.
- (١٧) وزارة الزراعة، شبكة الأرصاد الجوية الزراعية العراقية، بيانات منشورة على الموقع الالكتروني: <http://www.agromet.gov.iq>